

【空間座標】

1 xy平面, zx平面, y軸, 原点のそれぞれに関して, 点(1, -3, 2)と対称な点の座標を求めよ。

xy平面 ( 1 , -3 , -2 )

zx平面 ( 1 , 3 , 2 )

y軸 ( -1 , -3 , -2 )

原点 ( -1 , 3 , -2 )


2 右の図の直方体OABC-RSPQにおいて, 点Pの座標が(3, 2, 1)のとき, 次の点の座標を求めよ。

B ( 3 , 2 , 0 )

C ( 0 , 2 , 0 )

Q ( 0 , 2 , 1 )

R ( 0 , 0 , 1 )



3 原点Oと次の点の距離を求めよ。

(1) P(2, 3, 6)

(2) Q(3, 4, -5)

$OP = \sqrt{4 + 9 + 36}$

$OQ = \sqrt{9 + 16 + 25}$

$= \sqrt{49}$

$= \sqrt{50}$

$= 7 //$

$= 5\sqrt{2} //$

4 2点A(3, a, 1), B(1, 4, -3)が, 原点Oから等距離にあるとき, aの値を求めよ。

$OA = \sqrt{9 + a^2 + 1} = \sqrt{a^2 + 10}$

$OB = \sqrt{1 + 16 + 9} = \sqrt{26}$

$OA = OB$

$\sqrt{a^2 + 10} = \sqrt{26}$

$a^2 + 10 = 26$

$a^2 = 16$

$a = \pm 4 //$

5 y軸上であって, 2点A(3, 1, 0), B(0, 3, 5)から等距離にある点Pの座標を求めよ。

$P(0, y, 0)$

$\vec{AP} = (-3, y-1, 0) \quad |\vec{AP}| = \sqrt{9 + (y-1)^2 + 0}$

$\vec{BP} = (0, y-3, -5) \quad |\vec{BP}| = \sqrt{0 + (y-3)^2 + 25}$

$|\vec{AP}| = |\vec{BP}|$

$|\vec{AP}|^2 = |\vec{BP}|^2$

$9 + (y-1)^2 = (y-3)^2 + 25$

$9 + y^2 - 2y + 1 = y^2 - 6y + 9 + 25$


$4y = 24$

$y = 6$

$\therefore P(0, 6, 0) //$

【空間のベクトル】

6 右の図の直方体において,  $\vec{AE}$ に等しいベクトルをあげよ。また,  $\vec{AD}$ の逆ベクトルで $\vec{DA}$ 以外のものをあげよ。




$\vec{AE}$ に等しいベクトル

$\vec{BF}, \vec{CG}, \vec{DH} //$

$\vec{AD}$ の逆ベクトル

$\vec{CB}, \vec{GF}, \vec{HE} //$

7 右の図の平行六面体において, 次のベクトルを $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ を用いて表せ。



(1)  $\vec{EC} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c} //$

(2)  $\vec{BH} = -\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} //$

(3)  $\vec{DF} = -\vec{b} + \vec{a} + \vec{c}$   
 $= \vec{a} - \vec{b} + \vec{c} //$

【空間のベクトルの成分と大きさ】

8 次のベクトルの大きさを求めよ。

(1)  $\vec{a} = (3, 4, 5)$

(2)  $\vec{b} = (-1, 2, -2)$

$|\vec{a}| = \sqrt{9 + 16 + 25}$

$|\vec{b}| = \sqrt{1 + 4 + 4}$

$= 6\sqrt{2} //$

$= 3 //$

9  $\vec{a} = (1, 3, -2), \vec{b} = (4, -3, 0)$ のとき, 次のベクトルを求めよ。

(1)  $3\vec{a} + 2\vec{b}$

$= 3(1, 3, -2) + 2(4, -3, 0)$

$= (3, 9, -6) + (8, -6, 0)$

$= (11, 3, -6) //$

(3)  $2(-\vec{a} + 4\vec{b})$

$= -2\vec{a} + 8\vec{b}$

$= -2(1, 3, -2) + 8(4, -3, 0)$

$= (-2, -6, 4) + (32, -24, 0)$

$= (30, -30, 4) //$

10 次の2点A, Bについて,  $\vec{AB}$ を成分表示し,  $|\vec{AB}|$ を求めよ。

(1) A(2, 1, 4), B(3, -1, 5)

(2) A(3, 0, -2), B(1, -4, 2)

$\vec{AB} = (1, -2, 1) //$

$\vec{AB} = (-2, -4, 4) //$

$|\vec{AB}| = \sqrt{1 + 4 + 1}$

$|\vec{AB}| = \sqrt{4 + 16 + 16}$

$= \sqrt{6} //$

$= 6 //$

空間ベクトル②

11  $\vec{a}=(x, y, z), \vec{b}=(-2y+7, 1-z, 5x+2)$  が等しくなるように,  $x, y, z$  の値を定めよ。

$$\begin{cases} x = -2y + 7 & \text{--- ①} \\ y = 1 - z & \text{--- ②} \\ z = 5x + 2 & \text{--- ③} \end{cases} \quad x \text{ と } y \text{ の式} = z \text{ へ ① と ②$$

② を ③ に代入

$$\begin{aligned} y &= 1 - (5x + 2) \\ y &= -5x - 1 \quad \text{--- ④} \end{aligned}$$

① を代入

$$y = -5(-2y + 7) - 1$$

$$y = 10y - 35 - 1$$

$$9y = 36$$

$$y = 4$$

① を代入

$$\begin{aligned} x &= -8 + 7 \\ &= -1 \end{aligned}$$

③ を代入

$$\begin{aligned} z &= -5 + 2 \\ &= -3 \end{aligned}$$

$x > z$

$$\underline{x = -1, y = 4, z = -3}$$

12  $\vec{a}=(1, -2, -1), \vec{b}=(1, -1, -2), \vec{c}=(3, -2, -2)$  のとき,  $\vec{p}=(-2, 3, -2)$  を  $\vec{p}=s\vec{a}+t\vec{b}+u\vec{c}$  の形に表せ。

$$\vec{p} = s\vec{a} + t\vec{b} + u\vec{c}$$

$$(-2, 3, -2) = s(1, -2, -1) + t(1, -1, -2) + u(3, -2, -2)$$

$$= (s+t+3u, -2s-t-2u, -s-2t-2u)$$

$$\begin{cases} s+t+3u = -2 & \text{--- ①} \\ -2s-t-2u = 3 & \text{--- ②} \\ -s-2t-2u = -2 & \text{--- ③} \end{cases} \quad \begin{array}{l} u \text{ を消す} \\ u \text{ を消す} \end{array}$$

① × 2 + ② × 3

$$2s + 2t + 6u = -4$$

$$+ -6s - 3t - 6u = 9$$

$$-4s - t = 5 \quad \text{--- ④}$$

② - ③

$$-s + t = 5 \quad \text{--- ⑤}$$

④ + ⑤

$$-5s = 10$$

$$s = -2$$

⑤ を代入

$$t = 3$$

① を代入

$$-2 + 3 + 3u = -2$$

$$3u = -3$$

$$u = -1$$

$s > z$


$$\underline{\vec{p} = -2\vec{a} + 3\vec{b} - \vec{c}}$$

13 座標空間に平行四辺形 ABDC があり,  $A(2, 1, 5), B(-1, 2, 3), C(1, 0, -1), D(x, y, z)$  であるとする。  $x, y, z$  の値を定めよ。

$$\vec{AC} = \vec{BD}$$

$$\vec{AC} = (-1, -1, -6)$$

$$\vec{BD} = (x+1, y-2, z-3)$$



$$\begin{cases} x+1 = -1 \\ y-2 = -1 \\ z-3 = -6 \end{cases}$$

$$\underline{x = -2, y = 1, z = -3}$$

14  $\vec{a}=(2, -4, -3), \vec{b}=(1, -1, 1)$  について,  $|\vec{a}+t\vec{b}|$  を最小にする実数  $t$  の値と, そのときの最小値を求めよ。

$$|\vec{a}+t\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2t\vec{a}\cdot\vec{b} + t^2|\vec{b}|^2$$

$$\begin{pmatrix} |\vec{a}| = \sqrt{4+16+9} = \sqrt{29} \\ |\vec{b}| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3} \\ \vec{a}\cdot\vec{b} = 2+4-3 = 3 \end{pmatrix}$$

$$= 29 + 6t + 3t^2$$


$$= 3t^2 + 6t + 29$$

$$= 3(t^2 + 2t) + 29$$

$$= 3\left\{ (t+1)^2 - 1 \right\} + 29$$

$$= 3(t+1)^2 - 3 + 29$$

$$= 3(t+1)^2 + 26$$



$s > z$

$$|\vec{a}+t\vec{b}|^2 \text{ の } \min \geq 26 \quad (t = -1)$$

$$|\vec{a}+t\vec{b}| \text{ の } \min \sqrt{26} \quad (t = -1)$$

【ベクトルの内積となす角】

15 次の2つのベクトル  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  のなす角  $\theta$  を求めよ。

$\vec{a}=(2, -1, -2), \vec{b}=(4, 3, -5)$

$\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$

$$\left( \begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= 8 - 3 + 10 = 15 \\ |\vec{a}| &= \sqrt{4 + 1 + 4} = 3 \\ |\vec{b}| &= \sqrt{16 + 9 + 25} = 5\sqrt{2} \end{aligned} \right)$$


$= \frac{15}{3 \cdot 5\sqrt{2}}$

$= \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\therefore \theta = 45^\circ$

16 3点 A(2, 1, 0), B(0, 2, 1), C(1, 0, 2) を頂点とする  $\triangle ABC$  において、 $\angle BAC$  の大きさを求めよ。

$\cos\theta = \frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{|\vec{AB}| |\vec{AC}|}$



$$\left( \begin{aligned} \vec{AB} &= (-2, 1, 1) & |\vec{AB}| &= \sqrt{4 + 1 + 1} = \sqrt{6} \\ \vec{AC} &= (-1, -1, 2) & |\vec{AC}| &= \sqrt{1 + 1 + 4} = \sqrt{6} \\ \vec{AB} \cdot \vec{AC} &= 2 - 1 + 2 = 3 \end{aligned} \right)$$

$= \frac{3}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}}$

$= \frac{1}{2}$

$\therefore \theta = 60^\circ$

【ベクトルの成分と垂直条件】

18 ベクトル  $\vec{a}=(1, 0, 1), \vec{b}=(-1, 1, 0)$  の両方に垂直で、大きさが3のベクトル  $\vec{p}$  を求めよ。

$\vec{p} = (x, y, z)$  とおく

$\vec{a} \cdot \vec{p} = 0 \quad \therefore y$

$x + z = 0 \quad \text{--- ①} \quad z = -x \quad \text{--- ①'}$

$\vec{b} \cdot \vec{p} = 0 \quad \therefore y$

$-x + y = 0 \quad \text{--- ②} \quad y = x \quad \text{--- ②'}$

$|\vec{p}| = 3 \quad \therefore y$

$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 3$

$x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad \text{--- ③}$

①', ②' を ③ に代入

①' ②' に代入

$x^2 + x^2 + x^2 = 9$

$x^2 = 3$

$x = \pm\sqrt{3}$

$\vec{p} = (\sqrt{3}, \sqrt{3}, -\sqrt{3})$

$(-\sqrt{3}, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$

17  $\vec{a}=(1, 2, x), \vec{b}=(-x^2, 2, 3)$  が垂直になるように、 $x$  の値を定めよ。

$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

$-x^2 + 4 + 3x = 0$

$x^2 - 3x - 4 = 0$

$(x-4)(x+1) = 0$

$x = -1, 4$

【一直線上にある3点】

19 次の3点 A(2, 3, 6), B(8, 1, 8), C(-1, x, y) が一直線上にあるとき、 $x, y$  の値を求めよ。

3点 A, B, C が一直線上

$\vec{AC} = k \vec{AB}$

$$\left( \begin{aligned} \vec{AC} &= (-3, x-3, y-6) \\ \vec{AB} &= (6, -2, 2) \end{aligned} \right)$$

$(-3, x-3, y-6) = k(6, -2, 2)$   
 $= (6k, -2k, 2k)$

$$\begin{cases} -3 = 6k & \text{--- ①} \\ x-3 = -2k & \text{--- ②} \\ y-6 = 2k & \text{--- ③} \end{cases}$$

①より  $k = -\frac{1}{2}$

③に代入

$y-6 = -1$

$y = 5$

②に代入

$x-3 = 1$

$x = 4$

$\therefore$

$x = 4, y = 5$

【同一平面上にある4点】

20 3点 A(3, 1, 2), B(2, 0, -2), C(1, 1, 0) の定める平面 ABC 上に点 P(2, -3, z) があるとき、 $z$  の値を求めよ。

$\vec{CP} = s \vec{CA} + t \vec{CB}$

$$\left( \begin{aligned} \vec{CP} &= (1, 2, z) \\ \vec{CA} &= (2, 0, 2) \\ \vec{CB} &= (1, -1, -2) \end{aligned} \right)$$

$(1, 2, z) = s(2, 0, 2) + t(1, -1, -2)$

$= (2s, 0, 2s) + (t, -t, -2t)$

$= (2s+t, -t, 2s-2t)$

$$\begin{cases} 1 = 2s+t & \text{--- ①} \\ 2 = -t & \text{--- ②} \\ z = 2s-2t & \text{--- ③} \end{cases}$$

①に代入

$1 = 2s - 2$

$2s = 3$

$s = \frac{3}{2}$

②より

$t = -2$


③に代入

$z = 3 + 4 = 7$

空間ベクトル④


【四面体と内分点】

21 四面体 OABC において、辺 AB を 2:1 に内分する点を D、線分 CD を 3:2 に内分する点を P とする。 $\vec{OA}=\vec{a}$ ,  $\vec{OB}=\vec{b}$ ,  $\vec{OC}=\vec{c}$  とするとき、 $\vec{OP}$  をそれぞれ  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  を用いて表せ。




$$\begin{aligned} \vec{OP} &= \frac{3\vec{OD} + 2\vec{C}}{2+3} \\ &= \frac{3}{5}\vec{OD} + \frac{2}{5}\vec{C} \\ \left( \begin{aligned} \vec{OD} &= \frac{\vec{a} + 2\vec{b}}{2+1} \\ &= \frac{\vec{a} + 2\vec{b}}{3} \end{aligned} \right) \\ &= \frac{3}{5} \left( \frac{\vec{a} + 2\vec{b}}{3} \right) + \frac{2}{5}\vec{c} \\ &= \frac{1}{5}\vec{a} + \frac{2}{5}\vec{b} + \frac{2}{5}\vec{c} \end{aligned}$$

22 四面体 OABC において、辺 BC の中点を P、辺 CA を 3:2 に内分する点を Q とする。 $\vec{OA}=\vec{a}$ ,  $\vec{OB}=\vec{b}$ ,  $\vec{OC}=\vec{c}$  とするとき、 $\vec{AP}$ ,  $\vec{BQ}$  をそれぞれ  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  を用いて表せ。



$$\begin{aligned} \vec{AP} &= \vec{OP} - \vec{OA} \\ &= \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2} - \vec{a} \\ &= -\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c} \\ \vec{BQ} &= \vec{OQ} - \vec{OB} \\ &= \frac{3\vec{a} + 2\vec{c}}{2+3} - \vec{b} \\ &= \frac{3}{5}\vec{a} - \vec{b} + \frac{2}{5}\vec{c} \end{aligned}$$

23 四面体 OABC において、 $\triangle ABC$  の重心を G、線分 OG を 3:1 に内分する点を P とする。 $\vec{OA}=\vec{a}$ ,  $\vec{OB}=\vec{b}$ ,  $\vec{OC}=\vec{c}$  とするとき、 $\vec{OP}$  をそれぞれ  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  を用いて表せ。




3点 O, P, G は一直線上

$$\begin{aligned} \vec{OP} &= \frac{3}{4}\vec{OG} \\ &= \frac{3}{4} \left( \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3} \right) \\ &= \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{4} \end{aligned}$$

【空間ベクトルと平面】

24 右の図のような直方体において、対角線 OF と平面 ABC の交点を P とする。OP:OF を求めよ。



$\vec{OA}=\vec{a}$ ,  $\vec{OB}=\vec{b}$ ,  $\vec{OC}=\vec{c}$  とする  
3点 O, P, F は一直線上


$$\begin{aligned} \vec{OP} &= k\vec{OF} \\ &= k(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \\ &= k\vec{a} + k\vec{b} + k\vec{c} \end{aligned}$$

4点 A, B, C, P は同一平面上  
 $k + k + k = 1$

$$\begin{aligned} 3k &= 1 \\ k &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$\therefore \vec{OP} = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$

25 四面体 OABC において、辺 OA の中点を M、辺 BC を 1:2 に内分する点を Q、線分 MQ の中点を R とし、直線 OR と平面 ABC の交点を P とする。OR:OP を求めよ。



$\vec{OA}=\vec{a}$ ,  $\vec{OB}=\vec{b}$ ,  $\vec{OC}=\vec{c}$  とする  
3点 O, R, P は一直線上

$$\begin{aligned} \vec{OP} &= k\vec{OR} \\ \left( \begin{aligned} \vec{OR} &= \frac{\vec{OM} + \vec{OQ}}{2} \\ &= \frac{1}{2}\vec{OM} + \frac{1}{2}\vec{OQ} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2} \left( \frac{2\vec{b} + \vec{c}}{1+2} \right) \\ &= \frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{2} \left( \frac{2}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c} \right) \\ &= \frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{6}\vec{c} \end{aligned} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{OP} &= k \left( \frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{6}\vec{c} \right) \\ &= \frac{1}{4}k\vec{a} + \frac{1}{3}k\vec{b} + \frac{1}{6}k\vec{c} \end{aligned}$$

4点 A, B, C, P は同一平面上

$$\frac{1}{4}k + \frac{1}{3}k + \frac{1}{6}k = 1$$

$$\frac{3}{12}k + \frac{4}{12}k + \frac{2}{12}k = 1 \quad \therefore \rightarrow$$

$$\begin{aligned} \frac{9}{12}k &= 1 \\ k &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$\vec{OP} = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{4}{9}\vec{b} + \frac{2}{9}\vec{c}$$

【内分点・外分点, 三角形の重心の座標】

26 2点A(0, 3, 7), B(3, -3, 1), C(-6, 2, -1)について, 次の点の座標を求めよ。

(1) 線分ABを2:1に内分する点

$$\left( \frac{1 \cdot 0 + 2 \cdot 3}{2+1}, \frac{1 \cdot 3 + 2 \cdot (-3)}{2+1}, \frac{1 \cdot 7 + 2 \cdot 1}{2+1} \right)$$

$$= \left( \frac{6}{3}, \frac{-3}{3}, \frac{9}{3} \right)$$

$$= (2, -1, 3)$$

(2) 線分ABを3:2に外分する点

$$\left( \frac{-2 \cdot 0 + 3 \cdot 3}{3-2}, \frac{-2 \cdot 3 + 3 \cdot (-3)}{3-2}, \frac{-2 \cdot 7 + 3 \cdot 1}{3-2} \right)$$

$$= (7, -15, -11)$$

(3) 線分BCの中点

$$\left( \frac{3-6}{2}, \frac{-3+2}{2}, \frac{1-1}{2} \right)$$

$$= \left( -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 0 \right)$$

(4)  $\triangle ABC$ の重心

$$\left( \frac{0+3-6}{3}, \frac{3-3+2}{3}, \frac{7+1-1}{3} \right)$$

$$= \left( -1, \frac{2}{3}, \frac{7}{3} \right)$$

【空間の2点間の距離】

27  $z$ 軸上であって, A(1, 2, 1), B(1, 4, -3)から等距離にある点Pの座標を求めよ。

$(0, 0, z)$

P(0, 0, z) とおく

$AP = BP$   
 $AP^2 = BP^2$

$$\left( \begin{array}{l} AP^2 = 1 + 4 + (z-1)^2 \\ BP^2 = 1 + 16 + (z+3)^2 \end{array} \right)$$

$$5 + (z-1)^2 = 17 + (z+3)^2$$

$$5 + z^2 - 2z + 1 = 17 + z^2 + 6z + 9$$

$$8z = -20$$

$$z = -\frac{5}{2}$$

$\therefore z$  P  $(0, 0, -\frac{5}{2})$

【座標平面に平行な平面の方程式】

28 点(1, 2, 3)を通り, 次の平面に平行な平面の方程式を求めよ。

- (1)  $xy$ 平面                      (2)  $yz$ 平面                      (3)  $y$ 軸に垂直
- $z = 3$                        $x = 1$                        $y = 2$

【球の公式】

29 次のような球面の方程式を求めよ。

(1) 原点を中心とする半径3の球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9$$

(2) 点(1, 2, -3)を中心とする半径4の球面

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 16$$

(3) 点A(0, 4, 1)を中心とし, 点B(2, 4, 5)を通る球面

$$x^2 + (y-4)^2 + (z-1)^2 = r^2 \quad \text{とおく}$$

(2, 4, 5)を通るから

$$4 + 0 + 16 = r^2$$

$$r^2 = 20$$

$\therefore$

$$x^2 + (y-4)^2 + (z-1)^2 = 20$$

(4) 2点A(4, -2, 1), B(0, 4, -5)を直径の両端とする球面の方程式を求めよ。


$$P(O) = AB \text{ の中点 } = \left( \frac{4+0}{2}, \frac{-2+4}{2}, \frac{1-5}{2} \right)$$

$$= (2, 1, -2)$$

$$\text{半径} = \sqrt{4 + 4 + 9} = \sqrt{22}$$

$\therefore$

$$(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 22$$



30 球面  $(x+1)^2 + (y-4)^2 + (z-2)^2 = 3^2$  と次の平面が交わる部分は円である。その中心の座標と半径を求めよ。

(1)  $yz$ 平面

$$x = 0 \quad \text{と仮定}$$

$$1 + (y-4)^2 + (z-2)^2 = 9$$

$$(y-4)^2 + (z-2)^2 = 8$$

$\therefore$  中心 (0, 4, 2)

半径  $2\sqrt{2}$

(2) 平面  $y=4$

$$y = 4 \quad \text{と仮定}$$

$$(x+1)^2 + 0 + (z-2)^2 = 9$$

$$(x+1)^2 + (z-2)^2 = 9$$

$\therefore$

中心 (-1, 4, 2)

半径 3